

L'ÉMISSOLE TACHETÉE

Mustelus asterias



VERTÉBRÉS



POISSONS
CARTILAGINEUX

TAILLE ADULTE

Entre 0,80 m et 1,20 m
Jusqu'à 1,50 m

POIDS ADULTE

4 à 5 kg

LONGÉVITÉ

25 ans

RÉPARTITION

Mers de la Manche, du Nord et Méditerranée |
Océan Atlantique Nord.

DESCRIPTION - PARTICULARITÉS

L'émissole tachetée fait partie de la famille des requins.

Elle a un corps fin et très allongé avec des nageoires assez courtes. Elle possède, sur le dessus de son corps, 4 replis de la peau appelés carènes.

Sa peau est particulièrement lisse et sa couleur varie du gris à gris-brun avec des taches blanches sur le dos (ce qui lui vaut son nom).

Elle est dotée d'un museau court avec une large bouche, dépassant presque le niveau arrière des yeux.

Comme beaucoup de ses congénères, elle possède 5 fentes branchiales.

L'émissole tachetée peut vivre en petit groupe, parfois associée à d'autres requins tels que les requins hâ *Galeorhinus galeus* et les émissoles lisses *Mustelus mustelus*.

L'émissole tachetée apprécie les fonds vaseux et sableux de 100 à 180 mètres de profondeur.

Assez sédentaire, elle ne supporte pas les eaux de température inférieure à 16°C et aurait tendance à se rapprocher des côtes en été, entreprenant de petites migrations sur 50 à 100 km.

REPRODUCTION

La maturité sexuelle est établie entre 2 et 3 ans.

Ovovivipare, la femelle donne naissance à plusieurs petits (dans une fourchette allant de 7 à 15 petits, certaines sources parlent même d'une trentaine !) après une gestation de 12 mois.

ALIMENTATION

Plus active de nuit que de jour, l'émissole est un poisson crabier : il se nourrit principalement de crustacés (crabes, homards, crevettes...).

À l'âge adulte, elle consomme également des petits poissons (mulets, chinchards, maquereaux, harengs...).



L'ÉMISSOLE TACHETÉE

Mustelus asterias

EN NORMANDIE

L'émissole tachetée est présente et toujours pêchée sur les côtes normandes, soit à la palangre ou au filet droit soit au chalut de fond.

Sur les étals des poissonniers, on la trouve sous le nom de saumonette.

Surnommé "arcasson" dans la Manche, elle est abondante entre juin et novembre.

En Normandie, du début du 20^e siècle à la fin des années 1970, la pêche au requin était courante.

Certains requins faisaient d'ailleurs l'objet d'une pêche traditionnelle dite "aux cordes".

Elle est aujourd'hui quasiment abandonnée en raison de la raréfaction de la ressource et de la protection de certaines espèces comme le requin taupe.

LES INTERACTIONS AVEC L'HOMME



Depuis 2009, l'émissole tachetée est classée dans la catégorie "Préoccupation mineure" de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

Cela signifie qu'elle ne présente qu'un faible risque de disparition.

Cette espèce côtière reste répandue mais est vulnérable à la capture dans les chaluts, les filets maillants, les trémails et les engins de pêche.

En 2015, Les scientifiques du Conseil International pour l'Exploration de la Mer ont préconisé une réduction des quantités pêchées afin de permettre aux populations d'émissoles de revenir à un bon niveau.



© La Cité de la Mer